

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

АРГУМЕНТУМ

Биологически активные добавки
Лекарственные средства



www.argumentum-ag.ru

О КОМПАНИИ

ООО «Аргументум» — производитель и дистрибьютор фармацевтической продукции на территории Российской Федерации. Компания является самостоятельным участником фармацевтического рынка нашей страны и Таможенного союза с 2017 года. В настоящее время компания активно эволюционирует, растет и формирует тщательно отобранную команду специалистов, активно работающих с дистрибьюторами и конечными потребителями нашей продукции. Мы особенно ценим единение нашей команды с целью продуктивной работы в непростых современных реалиях на рынке, чему способствует вовлеченность наших сотрудников на всех этапах работы, позволяя оперативно обмениваться информацией внутри коллектива и реагировать на потребности клиентов.

В настоящее время ООО «Аргументум» — это надежная компания, специализирующаяся на производстве, импорте и дистрибьюции лекарственных средств, жизненно важных препаратов, а также биологически активных добавок. Продукция компании производится на контрактных площадках в РФ, Европе и Азии в соответствии со стандартами GMP — благодаря этому наши контрагенты получают возможность приобретать продукты высокого качества.



Генеральный директор
ООО «Аргументум»
Кузнецов Егор Игоревич

СОДЕРЖАНИЕ

Биологически активные добавки

Миофертал® 03 / 04

Бруди® Плюс 05 / 06

Лекарственные средства

Анеста®-А 07 / 08

Анима-А 09 / 10

Ранокардум® 11 / 12

Варфалан® 13 / 14

Тигециклин 15 / 16

Микафунгин 17 / 18

Азитромицин 19 / 20

Контакты 21



Бренд:
Миофертал®

Действующие вещества:
Мио-инозитол 1000 мг
Фолиевая кислота 200 мкг

Условия отпуска:
Без рецепта

Форма выпуска:
Порошок

Фасовка:
30 пакетиков-стик по 2 г.

СОГР:
RU.77.99.88.003.R.004532.12.21 от 06.12.2021

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Рекомендуется в качестве **дополнительного источника витаминов** при **гормональных нарушениях** у женщин.

В комбинированной терапии состояний, обусловленных инсулинорезистентностью (совместно с коррекцией питания и физической активностью):

- Для профилактики гестационного сахарного диабета.
- Для профилактики дефектов нервной трубки плода и других осложнений беременности (фетоплацентарная недостаточность, задержка роста плода и др.).

В качестве вспомогательного средства (биологически активной добавки) в терапии состояний, обусловленных синдромом поликистозных яичников (СПКЯ):

- Для восстановления функции яичников, менструального цикла;
- Для наступления желательной беременности;
- Для повышения качества ооцитов при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению.
- Для снижения синтеза тестостерона и устранения клинических проявлений андрогенных нарушений (гирсутизм, жирная кожа, акне, сальность и выпадение волос);

В качестве дополнительного источника мио-инозитола и фолиевой кислоты:

- При нарушениях менструального цикла, ановуляции;
- При планировании беременности;
- При проявлениях гиперандрогении у женщин (гирсутизм, жирная кожа, акне, сальность и выпадение волос);
- При нарушении сперматогенеза;
- При патологиях, нарушающих синтез мио-инозитола в почках;
- При повышенных умственной и физической нагрузках.

***Более подробная информация в инструкции по применению**

Держатель СОГР:

ООО «Аргументум», Россия

Производитель:

СОКИМ Интернешнл С.п.А., Италия

Веб-сайт:

www.miofertal.ru

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

**Бренд:**

Бруди® Плюс

Действующие вещества:

Докозагексаеновая кислота 350 мг

Условия отпуска:

Без рецепта

Форма выпуска:

Капсулы

Фасовка:

30 или 90 мягких желатиновых капсул
по 700 мг во флаконе

СОГР:

RU.77.99.11.003.E.009071.10.13 от 22.10.2013

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Рекомендуется в качестве **дополнительного источника полиненасыщенных жирных кислот Омега 3** (докозагексаеновой кислоты).
В том числе **для улучшения качественных и количественных показателей спермограммы.**

БРУДИ®ПЛЮС оригинальный продукт для мужского здоровья, биологически активная добавка к пище, которая способствует уменьшению фрагментации ДНК сперматозоидов.

БАД, в состав которой входит докозагексаеновая кислота (ДГК в виде триглицеридов). По данным клинических исследований способствует увеличению подвижности сперматозоидов и качества спермы; способствует уменьшению фрагментации ДНК сперматозоидов.

Основным ингредиентом продукта БРУДИ®ПЛЮС является докозагексаеновая кислота в виде триглицеридов, химически синтезированная путем ферментативной этерификации докозагексаеновой кислоты с глицеролом.

ДГК (Докозагексаеновая кислота) – незаменимая полиненасыщенная жирная кислота (ПНЖК) класса Омега 3.

Благодаря сложному производственному процессу был получен оригинальный продукт БРУДИ® ПЛЮС, целью разработки которого было улучшить биодоступность докозагексаеновой кислоты и ее действие.

Докозагексаеновая кислота относится к наиболее ценным для здоровья человека ПНЖК Омега 3. ДГК практически отсутствует в растительных жирах, а содержится в жире морских рыб. ДГК важна для формирования мозга и зрения ребенка, полезна для мозгового кровообращения.

По данным клинических исследований, более высокая концентрации докозагексаеновой кислоты в семенной жидкости способствует увеличению подвижности сперматозоидов и качества спермы, а соответственно вероятности зачатия.

***Более подробная информация в инструкции по применению**

Держатель СОГР:

БРУДИ ТЕКНОЛОДЖИ, С.Л., Испания

Производитель:

БРУДИ ТЕКНОЛОДЖИ, С.Л., Испания

Веб-сайт:

www.brudyplus.ru

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.



Бренд:
Анеста®- А

Действующие вещества:
1 г крема содержит
лидокаин 25 мг,
прилокаин 25 мг

Условия отпуска:
Без рецепта

Лекарственная форма:
Крем для местного и наружного
применения

Форма выпуска:
5 г / 30 г / 60 г / 100 г

РУ:
ЛП-005914

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Крем для поверхностной анестезии кожи и
слизистых, **обеспечивает снижение
неприятных ощущений** на коже во время
проведения **косметологических процедур**.

«АНЕСТА®-А»: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

У взрослых:

- Поверхностная анестезия кожи при инъекциях (в т.ч. при вакцинации), пункциях и катетеризации сосудов и поверхностных хирургических вмешательствах, включая небольшие косметологические процедуры и эпиляцию;
- Поверхностная анестезия трофических язв нижних конечностей при хирургической обработке (механической очистке), например, для удаления фибрина, гноя и некротических тканей;
- Поверхностная анестезия слизистой оболочки половых органов перед проведением болезненных манипуляций и для обезболивания перед инъекциями местных анестетиков.

У детей:

- Поверхностная анестезия кожи при инъекциях (в т.ч. при вакцинации), пункциях и катетеризации сосудов и поверхностных хирургических вмешательствах (в т.ч. при удалении контагиозного моллюска).

***Более подробная информация в инструкции по применению**

Владелец РУ:

ООО «Аргументум», Россия

Производитель:

Аджидо Фармацевтикалз Лтд., Индия.
или АО «Фармцентр ВИЛАР», Россия

Веб-сайт:

www.anesta.farm

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Бренд:
Анима-А

Действующие вещества:
1 г крема содержит
декспантенол 50 мг,
хлоргексидин 5 мг

Условия отпуска:
Без рецепта

Лекарственная форма:
Крем для местного и наружного
применения

Форма выпуска:
10 г / 30 г / 60 г / 100 г

РУ:
ЛП-008688

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АНИМА-А – **стимулятор регенерации тканей**

«АНИМА-А»: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка и лечение небольших ран с угрозой инфицирования, таких как ссадины, царапины, небольшие порезы и расчесы, трещины, легкие ожоги; инфицированных поверхностных поражений кожи; трещин сосков в период грудного вскармливания.

- При хронических ранах, например, трофических язвах голени, пролежнях, а также при операционных ранах.

***Более подробная информация в инструкции по применению**

Владелец РУ:

ООО «Аргументум», Россия

Производитель:

Аджио Фармацевтикалз Лтд., Индия.
или АО «Фармцентр ВИЛАР», Россия

Веб-сайт:

www.anima.farm

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Бренд:

Ранокардум®

Действующее вещество:

Ранолазин

Дозировка:

500 мг, 750 мг, 1000 мг

Условия отпуска:

По рецепту

Лекарственная форма:

Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

Форма выпуска:

30 или 60 таблеток в упаковке

РУ:

ЛП-006519

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Антиангинальное средство, позволяет сердцу полноценно расслабиться в диастолу, обладает антиаритмическим, антигипоксическим, гипогликемическим, кардиопротективным действием.

«РАНОКАРДУМ®»: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания:

Стабильная стенокардия.

Режим дозирования:

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Принимают внутрь независимо от приема пищи.

Рекомендованная начальная доза составляет 500 мг 2 раза/сут. Через 2-4 недели доза при необходимости может быть увеличена до 1000 мг 2 раза/сут. Максимальная суточная доза составляет 2000 мг.

Для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (III-IV функциональные классы по классификации NYHA), с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести (КК 30-80 мл/мин), печеночной недостаточностью легкой степени тяжести (5-6 баллов по классификации Чайлд-Пью), а также для пациентов с массой тела менее 60 кг и пациентов старше 75 лет рекомендуется титрование дозы.

***Более подробная информация в инструкции по применению**

Владелец РУ:

ООО «Аргументум», Россия

Производитель:

Аджио Фармацевтикалз Лтд., Индия

Веб-сайт:

www.ranocardum.ru

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Бренд:
Варфалан®

Действующее вещество:
Варфарина натрия клатрат 2,73 мг в пересчете на варфарин натрия 2,5 мг

Дозировка: 2,5 мг

Условия отпуска:
По рецепту

Лекарственная форма:
Таблетки

Форма выпуска:
50 или 100 таблеток в упаковке

РУ:
ЛП-006441

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Антикоагулянтное средство непрямого действия

«ВАРФАЛАН®»: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания:

- Лечение и профилактика тромбоза и эмболии кровеносных сосудов: острый венозный тромбоз и эмболия легочной артерии; послеоперационный тромбоз; повторный инфаркт миокарда;
- В качестве дополнительного средства при проведении хирургического или медикаментозного (тромболитического) лечения тромбоза, а также при электрической кардиоверсии мерцательной аритмии;
- Рецидивирующий венозный тромбоз;
- Повторная эмболия легочной артерии;
- Протезирование клапанов сердца и сосудов (возможна комбинация с ацетилсалициловой кислотой);
- Тромбоз периферических, коронарных и мозговых артерий;
- Вторичная профилактика тромбоза и тромбоемболии после инфаркта миокарда и при мерцании предсердий.

Режим дозирования:

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов.

Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Индивидуальный, в зависимости от параметров свертывания крови, реакции больного на лечение, клинической ситуации.

Принимают внутрь в дозе 2,5-10 мг/сут.

*Более подробная информация в инструкции по применению

Владелец РУ:

ООО «Аргументум», Россия

Производитель:

Аджидо Фармацевтикалз Лтд., Индия

Веб-сайт:

www.varfalan.ru

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Действующее вещество:

Тигециклин

Дозировка:

50 мг

Условия отпуска:

По рецепту

Лекарственная форма:

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Форма выпуска:

Флакон из прозрачного бесцветного стекла I гидрологического класса

РУ:

ЛП-008671

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Антибиотик группы тетрациклинов, класса глицилциклинов

«ТИГЕЦИКЛИН»: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания:

- Осложненные инфекции кожи и мягких тканей;
- Осложненные интраабдоминальные инфекции;
- Внебольничная пневмония.

Режим дозирования:

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Вводят в/в капельно в течение 30-60 мин. Начальная доза для взрослых составляет 100 мг, далее по 50 мг через каждые 12 ч.

Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлд Пью) после введения начальной дозы 100 мг, в последующем вводят по 25 мг каждые 12 ч; при этом необходимо соблюдать осторожность и контролировать реакцию больного на лечение. Продолжительность лечения определяется тяжестью и локализацией инфекции, и клинической реакцией больного на лечение и составляет 5-14 дней.

***Более подробная информация в инструкции по применению**

Владелец РУ:

ООО «Аргументум», Россия

Производитель:

К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л., Румыния

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Действующее вещество:

Микафунгин натрия

Дозировка:

50 мг, 100 мг

Условия отпуска:

По рецепту

Лекарственная форма:

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Форма выпуска:

Флакон из прозрачного бесцветного стекла I гидрологического класса

РУ:

ЛП-008611

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Противогрибковое средство, производное эхинокандина

«МИКАФУНГИН»: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания:

Лечение эзофагеального кандидоза. Профилактика кандидоза у пациентов после пересадки гемопоэтических стволовых клеток.

Режим дозирования:

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Применяют в/в в виде инфузии.

Для лечения эзофагеального кандидоза 150 мг/сут.

Для профилактики кандидоза у пациентов после пересадки гемопоэтических стволовых клеток доза составляет 50 мг/сут длительность применения устанавливается индивидуально.

****Более подробная информация в инструкции по применению***

Владелец РУ:

ООО «Аргументум», Россия


Производитель:

К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л., Румыния

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



Действующее вещество:

Азитромицин

Дозировка:

500 мг

Условия отпуска:

По рецепту

Лекарственная форма:

Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Форма выпуска:

Флакон из прозрачного бесцветного стекла I гидрологического класса

РУ:

ЛП-008481

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Антибиотик группы макролидов, является представителем азалидов

«АЗИТРОМИЦИН»: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Показания:

Внебольничная пневмония тяжелого течения, вызванная *Chlamydia pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Legionella pneumophila*, *Moraxella catarrhalis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* или *Streptococcus pneumoniae*; инфекционно-воспалительные заболевания органов малого таза тяжелого течения (эндометрит и сальпингит), вызванные *Chlamydia trachomatis* или *Neisseria gonorrhoeae* и *Mycoplasma homini*.

Режим дозирования:

Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов. Оптимальный режим дозирования определяет врач. Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования.

Вводят в/в капельно в дозе 500 мг/сут. Максимальный курс лечения составляет 5 дней, после чего назначают азитромицин для приема внутрь.

****Более подробная информация в инструкции по применению***

Владелец РУ:

ООО «Аргументум», Россия

Производитель:

К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л., Румыния

QR-код со [ссылкой](#) на препарат в электронном каталоге



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Наши контакты

Общество с ограниченной ответственностью «Аргументум»

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, дом 29, этаж 1, помещение VI, комната 39, офис 62

ОГРН: 1177746673202 / **ИНН:** 7731375015 / **КПП:** 773101001



Тел.:
+7 499 110-09-12

Электронная почта:
info@argumentum-ag.ru

Веб-сайт:
www.argumentum-ag.ru

Мегамаркет



Wildberries



Яндекс Маркет



Озон

